

Enquête hygiène des mains dans un réseau ligérien d'EHPAD



Réseau CORHYLIN

HISL Hôpital Intercommunal Sèvre et Loire

Contexte

- Journée mondiale d'hygiène des mains 5 mai 2011
 - Identification d'une action collective sur le réseau CORHYLIN = 5 EHPAD et 4 CH avec EHPAD
 - proposition d'un quizz
 - Intégration sur la base du volontariat de 2 EHPAD hors réseau : Hôpital Inter Sèvres et Loire (HISL)

Objectifs

- Sensibiliser les établissements à la problématique de l'hygiène des mains et de la friction hydro-alcoolique en s'inscrivant dans une démarche multimodale
- Evaluer les connaissances des professionnels
- Adapter les formations en prenant en compte les freins à l'hygiène des mains

Méthodes

- Enquête descriptive
- Volontariat : engagement de chaque établissement
- 2 Questionnaires
 - AS, IDE, kiné, ergothérapeute, médecin
 - ASH
- Période d'enquête : mai (CORHYLIN 2 semaines, HISL 2 jours)
- Traitement des données
 - Saisie : EOH HISL et EOH CORHYLIN
 - Analyse : EOH CORHYLIN

Résultats


Données concernant exclusivement les EPHAD

1) Echantillon

- Etablissements participants
 - CORHYLIN 9/12
 - HISL 2/2
- Nombre de répondants
n = 203
 - AS, IDE, DR n=142
 - ASH n=61

2) Représentations

les flores contaminantes




DANGER




Origine de la contamination des mains

AS, IDE, DR



ASH




4) Connaissances des soignants

1) Technique de réalisation de la FHA

	Nombre d'étapes N= 7	Nombre d'étapes N=6
Total	7%	16%

2) Observance

Les 5 indications à L'HYGIENE DES MAINS



Discussion

Discussion (1)

- **Représentations des soignants et ASH**
 - Des similitudes
 - Flore digestive (la plus contaminante) perçue moins contaminante que la flore cutanée
- **Connaissances**
 - Lavage simple des mains bien acquis pour tous
 - FHA à optimiser pour tous
 - <20% des soignants connaissent la technique

Discussion (2)

- Pratiques soignantes
 - Opportunités : inadéquation entre les pratiques et les représentations
 - < 35% hygiène des mains après contact avec environnement / alors que >90% des professionnels identifient un risque de contamination des mains à partir de l'environnement du patient
 - <55% hygiène des mains avant et après contact avec le patient / alors que >90% des professionnels identifient un risque de contamination des mains à partir de la flore cutanée du patient
 - Représentation du risque infectieux
 - « Ressenti d'un risque plus grand de contamination du patient vers le soignant, que du soignant vers un autre patient générant un comportement auto-protecteur »

Perspectives

- Comprendre les freins : milieu de vie/hospitalisation
- Essayer de changer les idées pour faire changer les comportements
- Développer une culture de sécurité institutionnelle

Remerciements aux établissements et aux professionnels

CORHYLIN

- EHPAD BLAIN
- EHPAD DERVAL
- EHPAD GUEMENE PENFAO
- EHPAD MARTIGNE FERCHAUD
- EHPAD PLESSE
- CH CHATEAUBRIANT (EHPAD)
- CH GRAND FOUGERAY(EHPAD)
- CH NOZAY(EHPAD)
- CH POUANCE(EHPAD)

HISL

- CH LOROUX (EHPAD)
- CH VERTOU (EHPAD)